


# Guida all'applicazione della Guida pratica livello 1B

(professionisti del settore medico-sanitario)

OSSERVARE SEMPRE LE RED FLAGS! 



\*Sindrome del piede diabetico e ulcera al piede

## RED FLAGS

- Infezione locale con sintomi sistemici o progressione rapida (febbre, IDSA\* 4)
- Sospetto di un'ischemia \*\* critica
- Considerare se ulcera di grado 3 (vedi appendice)
- Peggioramento dei reperti o nessun miglioramento adeguato (riduzione della ferita < 50% entro 4 settimane)
- Sospetto di necrosi (ferita nera)
- Deformità grave con necessità di correzione chirurgica
- Sospetto di Charcot
- Neuropatia dolorosa acuta
- Malattia renale allo stadio terminale (dialisi)

## Livello 2 - Gestione SPD

Criteri per la necessità di un piano di assistenza strutturato:

- Precedenti amputazioni/UPD
- Deformità
- Ulcera di grado  $\geq 2$  e/o ulcera plantare (esposta a pressione)
- Nessun miglioramento dopo 4 settimane di cure ottimali al livello 1
- Segni di infezione moderata (arrossamento > 2 cm, IDSA grado 3)
- L'intervento richiede l'imaging vascolare

## Livello 1B - Gestione SPD

Criteri che consentono un trattamento standard (massimo 3 - 4 settimane):

- Ulcera di grado 1
- Durata < 4 settimane
- Nessuna localizzazione esposta a pressione (non plantare)
- Nessuna neuropatia (monofilamento = 4/4, pallestesia > 4/8)
- Nessun'arteriopatia periferica significativa (= 2 polsi del piede palpabili, ABI  $\geq 0,9$ )
- Infezione assente o localizzata senza sintomi sistemici d'infezione (IDSA grado 1 e 2)

## Livello 1A - Gestione SPD

Criteri che consentono un trattamento standard (1 - 2 settimane):

- Ulcera di grado 1
- Durata < 1 settimana
- Nessuna localizzazione esposta a pressione (non plantare)
- Nessuna neuropatia (monofilamento = 4/4, pallestesia > 4/8)
- Nessun'arteriopatia periferica significativa (= 2 polsi del piede palpabili, ABI  $\geq 0,9$ )
- Nessuna infezione (IDSA grado 1)

## Livello 3:

Team interprofessionale della cura del piede diabetico

## Livello 2: Rete con specialista SPD

medicina di famiglia, angiologia, diabetologia, radiologia interventistica, tecnologia e servizio calzature ortopediche, chirurgia ortopedica, podologia HF, Medicina delle ferite, chirurgia vascolare & altri secondo necessità

## Livello 1B:

Medico di famiglia

## Livello 1A:

Farmacista, ASM, Podologo HF, Infermiere

\* Infectious Diseases Society of America (IDSA)

\*\* ABI < 0,5, tcPO2 < 25 mmHg, pressione alle dita del piede < 30 mmHg